Vass7R09s551-555

Vass7R09s551-555

Vass7R09s551-555

Collection Vassal-Montpellier

ահումատեսանում

Goloday 10 R70-331-335







NOM golodan.

EMPLACEMENT 10 R70-331335

ouche	Nbre yeux	Débou début	rrement mi/déb	Nbre grap	Ferti- lité		raison mi/f		Vé: début	raison mi/v	fin	Maturité
1	6	21,3	18.3*	0								
3 4 5	7+62	113	16,3:	0	Grappe Pour: Baie:	TG - (Mil: G - M - Sph-el:	1 : - P <u>D</u> :	<u>im</u> : obov-cy	l-fus		L - M -C
		Ce 18.	3 93 -2		Saveur Pépins Port :	: s	m - ai	r - fo yrène	ox − he	erb		·

ANNEE: 1994 NOM goloden Afg 187. EMPLACEMENT NO R7 A 331.335												
Souche	Whre yeux		urement mi/deb		Ferti- litá		raison mi/f			raison mi/v	fin	Naturité
TL1 2 f 3 f 4 5	9 42	23,3 28,2 3,3	734	0 0	Grappe Pour: Baie: Couleur Saveur Pépins Fort:	TG - 0 disc-sp r : B-0 : s -	Mil S - M ph-ell Gr-Rs-: m - a	l: - P I -ov-ob Rg-N r - fo	Dim: DOV-cyl	-fus inc -		: L - ::- C

ահաստանումումիայիայիայիանավ

<u>Ant</u>	ANNEE: 1995 NOM Golodon EMPLACEMENT lo R7 1331.335											
louche	Mbre yeux	Débourrement Mbre début mi/déb grap			Ferti- lité		raison mi/f	fin	Véi début	mi/v	fin	Maturit é
2 f	10	27.2	27.3.	0								
3 % 4	4	13.3	20.3. 16.3.	0	Grappe Pour : Baie :	TG	<u>Mil.</u>	1 : - P D:	im :		citě:	L - M -C
) le	20 .3	.95 en	TC (+3)	Couleur Saveur Pépins Fort :	<u>r</u> : B-0	Gr-Rs-l	Rg-Ņ	Jus	: inc	<u>-</u> ac	oloré

AMMER: 1996 (N)
WOM Golo-dan EMPLACMMENT. NO R7 1331, 335

iche	Whre yeux		urrament . mi/d∂b				raison mi/f			mi/v	Maturité.
1	Con	25.3	28.3.	0							` ,
2	3	22,3	-28:31	0		and and Person at 191100 mg]		
3 4 5	di u	25.3 LL 13	28.3.		Pour : Baie : Couleu Saveur	disc-s disc-s r : B-0	Mil G - M ph-ell Gr-Rs- m - a	1 : - P -ov-o Rg-N -r - f	Dim: bov-cy <u>dus</u> ox - he	l-fus : inc	: L - H- C

ubintimbutindum butindu

AMEET: 1997
inm golodan

Juntumlindia

EMPLACEMENT LORY A 334-335

iche.	Nbre yeux	Débourr man! début mi/deb		Forti- Cloudison Véraison Litté début mi/v fin	i mainitie
1 2 3 4 5 7	MTL 2 fble 17 9	dobut mi/dela	0 0	Grappo : : - M - P Dim : Compacito Cour : Mill : Cale : To - G - M - P Dim: disc -sph -ellov-obov-cyl-fus Coulour : B-Gr-Rs-Rq-N dus : Inc - co Savetu : s - m - ar - fox - herb Coulour : evec - apyrène Coulour : Vigueur :	

N° d'ordre :

luutuuluuti

Désignation : Emplacement :

-golodan 10 R7s-331-335.4.1

dudadaataalaataalaataal

(A) BOURGEONNEMENT

Epanoui 182 - moyen 183)- globuleux 184.

Glabre 185 - séteux 186 - velouté 187 - aranéeux 188 - duveteux 189 cotonneux 190 - sans villosité pubescente 278 - sans villosité laineuse 279.

Blanc 191 - fauve ou roux 192 - carminé 193 - à liséré carminé 194 jaune 195 - à plages bronzées ou cuivrées 196 - entièrement bronzé ou cuivré 197 - vert 198,

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

Etalees - en gouttière - autres.

Face inférieure : glabres 189 - séteuses 200 - veloutées 201 aranéeuses 202 - duveteuses 203 - cotonneuses 204 - sans villosité pubescente 280 - sans villosité laineuse 281.

Face supérieure : blanches 205 - fauves ou rousses 206 - carminées 207 à liséré carminé 208 - jaune 209 - à plages bronzées ou cuivrées 2/10/entièrement bronzées ou cuivrées 211 - vertes 212 - autres 213.

(Dans le cas où la première feuille détachée est à liséré carminé, la couleur de la 2ème et de la 3ème feuille détachées sera notée).

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Face inférieure

Nervures : glabre 214 - séteux 215 - velouté 216 - aranéeux 217 duveteux 218 - cotonneux 219 - sans villosité pubescente 282 sans villosité laineuse 283.

Limbe: glabre 2/20 - séteux 221 - velouté 222 - aranéeux 223 duveteux 224 - cotonneux 225 - sans villosité pubescente 284 sans villosité laineuse 285.

A limbe plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Face supérieure

Blanc 226 - fauve ou roux 227 - carminé 228 - à liséré carminé 229 jaune 230 - à plages bronzées ou cuivrées 231 - entièrement bronzées ou cuivrées 232 - verte 233/

A pétiole glabre 234) - séteux 235 - velouté 236 - aranéeux 237 duveteux 238 - cotonneux 239 - sans villosité pubescente 286 - sans villosité laineuse 287.

Totalement - sillon - partiellement.

-Calvo 91

N° d'ordre :

Luutuulaah

Désignation : Emplacement :

Noeuds

golodan 10 R72-331-335.s.1

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

dinataridan kalantari dan katul

A contour uni - anguleux - côtele. Glabre 242 - à épines ou analogues 243 - poils massifs 244 séteux 245 - velouté 246 - aranéeux 247 - duveteux 240 - cotonneux 241. sans villosité pubescente 288 - sans villosité laineuse 289. Entièrement - partiellement.

Mérithalle : dos coloré 248 - à raies 249 - vert 250. ventre coloré 251 - à raies 252 - vert 253.

: dos coloré 254 - à raies 255) - vert 256.

ventre coloré 257 - à raies 258) - vert 259. : verte 260 - jaune 261 - rouge clair 262 - rouge foncé 263. Vrille

subcontinues - intermittentes.

très courte - courte - movenne - longue - très longue.

: coloré 264 - vert 265) Bourgeon

(I) FLEUR

Bouton floral : gros - moyen - petit. Morphologiquement : male 4 - femelle 5 - hermaphrodite 6.

Calvo 91

N° d'ordre : Désignation :

luntumbenti

golodan 10 R75-331-335A-1

dindinalization landinalization landinalization landinalization landinalization landinalization landinalization

Emplacement :

FEUILLE ADULTE

Petite 141 - moyenne 142 /- grande 143.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre - séteux - velouté aranéeux - duveteux - cotonneux.

Face inférieure : nervures : glabre 144) - séteux 145 - velouté 146 aranéeux 147 - duveteux 148 - cotonneux 149 sans villosité pubescente 272 - sans villosité laineuse 273.

> limbe: glabre 150 - séteux 151 - velouté 152 aranéeux 153 - duveteux 154 - cotonneux 155 sans villosité pubescente 274 - sans villosité laineuse 275.

Limbe : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté. Lobes : plan - en gouttière - involuté - révoluté - tourmenté.

Surface: unie 156 - ondulée 157 - finement bullée 158 - moyennement bullée 162 - grossièrement bullée 159 - gauffrée 160 plissée au point pétiolaire 161.

Nervures : Paga comérieure : verte 163 - point pétiolaire rouge 164 partiellement rouge 165 - entièrement rouge 166.

> Face inférieure : verte 167) - partiellement rouge 168 entièrement rouge 169.

Couleur du limbo : vert clair - vert franc - vert fonce - autre.

Long 170 - moyen 1(1) - court 172. Glabre 173 - séteux 174 - velouté 175 - sans villosité pubescente 276 sillon - partiellement - totalement. Coloré 176 - particllement coloré 177) - vert 178. Aranéeux 179 - duveteux 180 - cotonneux 181 - sans villosité laineuse 277. partiellement "htalement.

Calvo 91

Année 1998

Nom cepage: 62 od an

hudududi

Observateur: Lacombe

Code cepage :

Code clone

Emplacement 10 R7 5331-335

doutenloutenlantenlaatuul

Grappe

oiv 202 longueur : très courte (<10cm) 1 - courte (10-15cm) 3)- moyenne (15-20cm) 5 - longue (20-30cm) 7 - très longue (>30cm) 9.

oiv 203 largeur : très étroite (<5cm) 1 - étroite (5-10cm) 3)- moyenne (10-15cm) 5 - large (15-

20cm) 7 - très large (>20cm) 9. oiv 204 compacité : très lâche 1 - lâche 3 - moyenne 5 - compacte 7 - très compacte 9.

oiv 206 longueur pédoncule : très court (<2cm) 1 - court (2-4cm) 3 - moyen (4-7cm) (5) - long (7-10cm) 7 - très long (>10cm) 9.

oiv 207 lignification du pédoncule : base seulement)- moitié 5 - plus de la moitié 7

oiv 208* forme : cylindrique 1 - conique ou pyramidale 2.

oiv 209* présence d'un aileron : absent 1) une aile 2 - deux ailes 3 - plus de deux ailes 4

Baie

ory 220 longueur: tres courte (<8mm) 1 - courte (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - longue

71 (20-26mm) Très longue (>26mm) 9.

oiv 221 largeur : très étroite (<8mm) 1 - étroite (8-14mm) 3 - moyenne (14-20mm) 5 - large (20-

?1 (comm) () - très large (≥26mm) 9.

DIV 222 uniformité de la grosseur : non uniforme 1 - uniforme 3

oiy 223 forme aplatic 1)- arrondie 2 - elliptique 3 - ovoide 4 - trongovoide 5 - obovoide 6 -

ylindrique 7 - arquée 8. O ombile (ties) deprime

oiv 225 couleur épiderme : vert jaune 1) rose 2 - rouge 3 - gris 4 - rouge violet 5 - bleu noir 6.

siv 226 uniformité couleur épiderme : non uniforme 1 - uniforme 2

ouv 227 pruine nulle ou très faible 1 - faible 3 - moyenne (5)- forte 7 - très forte 9.

niv 228 épaisseur pellicule : très mince 1 - mince 3 - moyenne 5 - épaisse 7 - tres épaisse 9.

onv 229 ombilic : peu apparent D- apparent 2 deprime

oly 230* coloration de la pulpe : non coloree D - coloree 2.

oiv 231 intensité coloration pulpe : non colorée () - coloration faible 3 - coloration moyenne 5 - torte coloration 7 - très forte coloration 9.

onv 232 succulence pulpe: peu juteuse 7 - juteuse 2.

oiv 233 rendement en jus (ml / 100g baies) : faible (>05) 3 - moyen (05-75) 5 éleve (>75) 7

OIV 235 fermeté pulpe : très faible 1 - faible 3 - moyenne 5 - élevée 7 - très élevce 9.

oiv 236 saveur : aucune () - goût muscat 2 - goût foxé 3 - goût herbacé 4 - goût spécial 5

oiy 236* saveur: aucune(1) - goût muscat 2 - goût foxe 3 - autre 4.

oiv 238 longueur pédicelle : très court (<4mm) 1 - court (4-8mm) 3 - moyen (8-12mm) 5- long

(12-16mm) 7 - très long (>16mm) 9.

orv 240 séparation du pédicelle : très facile 1 - facile 3 - moyen 5- difficile 7 - très difficile 9.

oiv 241 présence de pépins absents type corinthien 1 - rudimentaires type sultanien 2 - présents 3

oiv 242 longueur pépins: très courts 1 - courts 3 - moyens 5 - longs 7 - très longs 9

OIV 243 poids d'un pépin (moyenne de 100 pepins secs) très faible (~10mg) 1 - faible (25mg) 3 -

moyen (40mg) 5 - élevé (55mg) 7 - très élevé (~65mg) 9

oiv 244 cannelures transversales face dorsale pépins absentes (1) présentes 2

DENOMINATION : EMPLACEMENT :

luntum min

golodan 10 R71-331-335,812

dontodantodantodartad

SARMENT DE VIGNE

: long (1) - moyen (2) - court (3); : grêle (1) - moyen (2) - fort (3) Sarment : ramifié (1) - peu ramifié (2)

: adhérente avec lenticelles (1) - résistante se Ecorce

détachant en lames (2)

Section transversale : circulaire (1) - elliptique (2) - aplatie (3) autre (4).

: unie (1) - anguleuse (2) - striée (3) - côtelée (4). : pruinée (1) - partiellement pruinée (2) - non pruinée (3). : glabre (2) - à épines ou analogues (3) - à poils massifs (4) - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux (7) -Surface

duveteux (8) -cotonneux (9).
: entierement (1) - partiellement (2) - sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1) - fauve ou rousse (2) - grise (3).

: aplatis (1) - effacés (2) - globuleux (3) - saillants (4). Noeuds

Mérithalle de longueur moyenne : A. cms.

: gris (1) - jaune (2) - beige (3) - marron clair (4) marron foncé (5) - brun rouge (6) - violacé (7) - autre (8).

: uniforme (1) - à raies (2) - à bandes (3) - ou noeuds (4)

: plus foncé (0) - de couleur gris (1) - jaune (2) - beige (3) marron clair (4) marron fonce (5) - brun rouge (6))violacé (7) - autre (8).

: pointus en dard (1) - conigues (2) - arrondis (3) .-Yeux : marron (1) - brun rouge (2) - gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1) - large (2).
: saillant (1) - effacé(2).
: sinueux (1) - rectiligne perpendiculaire (2) rectiligne descendant (3) - rectiligne ascendant (4).

Calvo 90

N° d'ordre:
Désignation: golodon
Emplacement: NO R7 S 331.335

Juitindinin

```
: (1) - 2 - 3
Angle des nervures
                                  : 4 - 5 - 6
Sexe
                                  : 7 - 8 - 9
L1/1.
                                  : 10 - (11)
L2/L
                                  : 12 - 13 - 14 - 15 - 16
Nombre de lobes
                                  : 17 - 18 - 19 - 20
Prof. sinus latéral Sup.
                                  : 21 - 22 - 23 - 24
Prof. sinus latéral Inf.
                                  : 25 - 26 - 27 - 28 - 29
Forme sinus pétiolaire
Fond sinus pét. ni en U ni en V : 266
                                  : (26)
Sinus pétiolaire ouvert
Dent au fond du sinus pétiolaire : (30)
Forme sinus latéral Sup. : 31 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 37 - 38 + 39
Fond sinus latéral Sup. en V : 268 - en U : 269 - autre : 270
Sinus latéral Supérieur ouvert : (271)
                                  : 40 - (41)
Dents : forme
                                  : (42) - 43 - 44
Dents (angle)
                                  : 45 - 46 - (47)
Angle du lobe terminal
Sinus pét. (dégar. - gar. -1/2 dégar.): 48 - 49 - 50
Nbre dents du point pét. à L3 : 51 - 52 - 53 - 54 - 55 - 56 - 57 - 58- 59
                                  : (60) - 61 - 62
Angle des nervures L3 L'3
                                  : (63) - (64) - (65) - 66 - 67
Largeur du sinus pétiolaire
```

Dent terminale du lobe latéral supérieur

Direction : vers S.P. - droit - vers lobe terminal

Forme : à côtés rectilignes ou crochue - ogivale

Médiane/base (angle) : obtuses - moyennes - aigües

Renny 92